

EZCare™ Softouch Tracheostomy Tube Holder

REF

Catalog No.

	DIRECTIONS FOR USE INSTRUCTIONS D'UTILISATION ISTRUZIONI PER L'USO INSTRUCCIONES DE USO INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO GEBRAUCHSANWEISUNG NÁVOD K POUŽITÍ ZAŁECZENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA إرشادات الاستخدام
N9105	5" Single piece
N9106	6" Single piece
N9107	7" Single piece
N9108	8" Single piece
N9109	9" Single piece
N9110	10" Single piece
N9111	11" Single piece
N925	11" 2-piece
N926	18" 2-piece

Manufactured by
NEOTECH PRODUCTS LLC
28430 Witherspoon Parkway, Valencia, CA 91355, USA
1-800-966-0500 • neotechproducts.com

EC REP
EMERGO EUROPE
Prinsesegracht 20
2514 AP, The Hague, The Netherlands



D491 Rev E

English
EZCare™ Softouch
Tracheostomy Tube Holder

INDICATIONS FOR USE

The EZCare Softouch is intended to secure a patient's tracheostomy tube. It is intended for use on pediatric (neonates, infants and children) patients.

DIRECTIONS FOR USE

Measuring

Select proper size by using EZCare Softouch measuring tape strip provided.

Place start line at flange on left side and wrap behind neck to right flange. If measurement falls between sizes, try larger size first.

Single Piece (N9105-N9111)

Step 1 With smooth, white side facing neck, insert hook tab through flange on one side of plate.

Step 2 Pull tab back over flange and firmly press white hook fabric to neckband fabric to ensure proper securement.

Step 3 Wrap EZCare around neck and insert hook tab through flange on other side of plate.

Step 4 Pull tab back over flange and firmly press white hook fabric to neckband fabric to ensure proper securement.

Note: Ensure that EZCare is taught, but not overly stretched. Adjust as needed.

Step 5 Replace EZCare Softouch every 5 days or per hospital protocol, whichever is sooner.

Replace immediately if hook tab is worn or visibly soiled.

2-piece (N925-N926)

Step 1 Separate two pieces.

Step 2 With smooth, white side facing neck, insert hook tabs through flanges on each side of plate.

Step 3 Pull tab back over flange and firmly press white hook fabric to neckband fabric to ensure proper securement.

Step 4 Wrap both sides of EZCare around neck and bring together.

Step 5 Determine proper length, pull longer piece away from neck and cut excess.

Note: Ensure that skin will not be exposed to hook fabric secure tab.

Step 6 Bring both sides back together and firmly press white hook fabric secure tab to neckband fabric to ensure proper securement.

Note: Ensure that EZCare is taught, but not overly stretched. Adjust as needed.

Step 7 Replace EZCare Softouch every 5 days or per hospital protocol, whichever is sooner.

Replace immediately if hook tab is worn or visibly soiled.

CAUTIONS & WARNINGS

Federal law restricts this device to sale by or on the order of a physician.

Replace immediately if hook tab is worn or visibly soiled. Worn tab may cause decannulation.

Check regularly to prevent disengagement.

Discontinue immediately if skin irritation occurs.

Single patient use only.

French
EZCare™ Softouch
Fixation de tube de trachéotomie

INDICATIONS D'UTILISATION

Le dispositif EZCare Softouch est conçu pour fixer le tube de trachéotomie d'un patient. Il est conçu pour les patients pédiatriques (nouveau-nés, nourrissons et enfants).

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Mesure

Selectionner la bonne taille à l'aide du mètre ruban EZCare Softouch fourni.

Placer la ligne de début au niveau du versant gauche et enrouler derrière le cou jusqu'au versant droit. Si la mesure est comprise entre deux tailles, essayer d'abord la plus grande.

Pièce unique (N9105-N9111)

Étape 1 Le côté lisse et blanc orienté vers le cou, introduire la languette munie d'un crochet dans le versant sur un côté de la plaque.

Étape 2 Tirer la languette au-dessus du versant et presser fermement le tissu du crochet blanc contre le tissu de l'encolure afin de garantir une bonne fixation.

Étape 3 Enrouler EZCare autour du cou et introduire la languette munie d'un crochet dans le versant de l'autre côté de la plaque.

Étape 4 Tirer la languette au-dessus du versant et presser fermement le tissu du crochet blanc contre le tissu de l'encolure afin de garantir une bonne fixation.

Remarque : s'assurer que EZCare est serré, mais pas trop étiré. Ajuster au besoin.

Étape 5 Remplacer EZCare Softouch tous les 5 jours ou conformément au protocole de l'hôpital, en fonction du délai le plus court.

Remplacer immédiatement si la languette du crochet est usée ou si elle montre des traces de salissures visibles.

Deux pièces (N925-N926)

Étape 1 Séparer les deux pièces.

Étape 2 Le côté lisse et blanc orienté vers le cou, introduire la languette munie d'un crochet dans le versant sur un côté de la plaque.

Étape 3 Tirer la languette au-dessus du versant et presser fermement le tissu du crochet blanc contre le tissu de l'encolure afin de garantir une bonne fixation.

Étape 4 Enrouler les deux côtés de EZCare autour du cou et les rassembler.

Étape 5 Définir la bonne longueur, dégager la pièce la plus longue du cou et couper l'excédent.

Remarque : s'assurer que la peau ne soit pas exposée à la languette de fixation en tissu du crochet.

Étape 6 Rassembler de nouveau les deux côtés et presser fermement la languette de fixation en tissu du crochet blanc contre le tissu de l'encolure afin de garantir une bonne fixation.

Remarque : s'assurer que EZCare est serré, mais pas trop étiré. Ajuster au besoin.

Étape 7 Remplacer EZCare Softouch tous les 5 jours ou conformément au protocole de l'hôpital, en fonction du délai le plus court.

Remplacer immédiatement si la languette du crochet est usée ou si elle montre des traces de salissures visibles.

PRÉCAUTIONS ET AVERTISSEMENTS

La loi fédérale n'autorise la vente de ce dispositif que sur ordonnance ou par un médecin.

Remplacer immédiatement le produit si la languette à crochets est usée ou visiblement sale. Une languette usée peut provoquer une décanulation.

Vérifier régulièrement pour éviter tout dégagement.

En cas d'irritation de la peau, cesser d'utiliser le produit immédiatement.

À usage unique exclusivement.

Italiano
EZCare™ Softouch
Porta cannula tracheostomica

INDICAZIONI D'USO

EZCare Softouch è pensato per proteggere la cannula tracheostomica di un paziente. È destinato all'uso su pazienti pediatrici (neonati, infanti e bambini).

ISTRUZIONI PER L'USO

Misurazione

Selezionare la giusta dimensione usando il nastro adesivo per la misurazione EZCare Softouch fornito.

Posizionare la linea di partenza sulla flangia sinistra e ruotare intorno al collo fino alla flangia destra. Se la misurazione è compresa nelle dimensioni, provare prima una dimensione più grande.

Pezzo singolo (N9105-N9111)

Passo 1 Con il lato bianco e liscio rivolto verso il collo, inserire la linguetta con gancio nella flangia su un lato della piastra.

Passo 2 Ritirare la linguetta sulla flangia e premere con decisione il tessuto bianco con gancio contro il tessuto del collare per garantire un fissaggio corretto.

Passo 3 Avvolgere EZCare intorno al collo e inserire la linguetta con gancio nella flangia sull'altro lato della piastra.

Passo 4 Ritirare la linguetta sulla flangia e premere con decisione il tessuto bianco con gancio contro il tessuto del collare per garantire un fissaggio corretto.

Nota: assicurarsi che EZCare sia teso, ma non eccessivamente. Regolare come necessario.

Passo 5 Sostituire EXCare Softouch ogni 5 giorni o in base al protocollo ospedaliero, se precedente.

Sostituire immediatamente se la linguetta con gancio presenta usura o sporcizia visibili.

Due pezzi (N925-N926)

Passo 1 Separare i due pezzi.

Passo 2 Con il lato bianco e liscio rivolto verso il collo, inserire la linguetta con gancio nelle flange su un lato della piastra.

Passo 3 Ritirare la linguetta sulla flangia e premere con decisione il tessuto bianco con gancio contro il tessuto del collare per garantire un fissaggio corretto.

Passo 4 Avvolgere entrambe le estremità di EZCare intorno al collo e unire.

Passo 5 Determinare la lunghezza corretta, rimuovere dal collo il pezzo più lungo e tagliare l'eccesso.

Nota: Assicurarsi che pelle non sia esposta sulla linguetta di sicurezza in tessuto con gancio.

Passo 6 Riunire i due lati e premere con decisione la linguetta di sicurezza in tessuto bianco con gancio contro il tessuto del collare per garantire un fissaggio corretto.

Nota: assicurarsi che EZCare sia teso, ma non eccessivamente. Regolare come necessario.

Passo 7 Sostituire EXCare Softouch ogni 5 giorni o in base al protocollo ospedaliero, se precedente.

Sostituire immediatamente se la linguetta con gancio presenta usura o sporcizia visibili.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

La legge federale limita la vendita di questo dispositivo da parte o su prescrizione di un medico.

Sostituire immediatamente se la linguetta con gancio presenta usura o sporcizia visibili. Una linguetta usurata può causare la decannulazione.

Controllare regolarmente per prevenire il distacco.

Interrompere immediatamente in caso di irritazione cutanea.

Esclusivamente per uso monopaziente.

Español
EZCare™ Softouch
Portatubo para traqueotomía

INDICACIONES DE USO

EZCare Softouch está destinado para fijar un tubo de traqueotomía de un paciente. Está destinado al uso en pacientes pediátricos (recién nacidos, lactantes y niños).

INSTRUCCIONES DE USO

Medición

Seleccione el tamaño adecuado con la tira adhesiva de medición EZCare Softouch suministrada.

Coloque la línea de inicio en la brida en el lado izquierdo y envuélvala por detrás del cuello hacia la brida derecha. Si la medición es confusa, pruebe primero con el tamaño mayor.

Una sola pieza (N9105-N9111)

Paso 1 Con cuello lateral suave blanco, inserte la lengüeta de gancho a través de la brida en cada lado de la placa.

Paso 2 Tire de la lengüeta sobre la brida y presione con firmeza la tela del gancho blanco contra la tela de la banda del cuello para asegurarse de que se fija adecuadamente.

Paso 3 Envuelva EZCare alrededor del cuello e inserte la lengüeta del gancho a través de la brida en el otro lado de la placa.

Paso 4 Tire de la lengüeta sobre la brida y presione con firmeza la tela del gancho blanco contra la tela de la banda del cuello para asegurarse de que se fija adecuadamente.

Nota: Asegúrese de que EZCare esté tenso, pero no demasiado estirado. Ajuste según sea necesario.

Paso 5 Sustituya EZCare Softouch cada 5 días o según el protocolo hospitalario, el que sea el plazo más breve.

Sustituya de inmediato si la lengüeta del gancho está desgastada o se ve sucia.

2 piezas (N925-N926)

Paso 1 Separe las dos piezas.

Paso 2 Con cuello lateral suave blanco, inserte las lengüetas de gancho a través de lasbridas en cada lado de la placa.

Paso 3 Tire de la lengüeta sobre la brida y presione con firmeza la tela del gancho blanco contra la tela de la banda del cuello para asegurarse de que se fija adecuadamente.

Paso 4 Envuelva ambos lados de EZCare alrededor del cuello y júntelos.

Paso 5 Determine la longitud adecuada, aleje la pieza más larga

INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

O EZCare Softouch serve para proteger o tubo de traqueostomia de um paciente. Concebido para utilização em pacientes pediátricos (recém-nascidos, bebés e crianças).

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Medidas

Selecione o tamanho adequado usando a fita métrica fornecida com o EZCare Softouch.

Posicione a linha de arranque na flange do lado esquerdo e enrole à volta do pESCOço até a flange direita. Se as medidas estiverem entre tamanhos, tente primeiro um tamanho maior.

Peça única (N9105-N9111)

1º Passo

Com o lado liso e branco voltado para o pESCOço, insira a aba do gancho na flange de um dos lados da placa.

2º Passo Puxe a aba para trás sobre a flange e pressione firmemente o tecido do gancho branco no tecido do colarinho para garantir uma segurança adequada.

3º Passo Enrole o EZCare à volta do pESCOço e insira a aba do ganho através da flange no outro lado da placa.

4º Passo Puxe a aba para trás sobre a flange e pressione firmemente o tecido do ganho branco no tecido do colarinho para garantir uma segurança adequada.

Nota: Certifique-se de que o EZCare está apertado, mas não excessivamente esticado. Ajuste conforme necessário.

5º Passo Substitua o EZCare Softouch a cada 5 dias ou de acordo com o protocolo hospitalar, o que ocorrer primeiro.

Substitua imediatamente se a aba do ganho estiver visivelmente gasta ou suja.

2-peças (N925-N926)

1º Passo Separe as duas peças.

2º Passo Com o lado liso e branco voltado para o pESCOço, insira as abas do ganho nas flanges de cada um dos lados da placa.

3º Passo Puxe a aba para trás sobre a flange e pressione firmemente o tecido do ganho branco no tecido do colarinho para garantir uma segurança adequada.

4º Passo Enrole os dois lados do EZCare ao redor do pESCOço e junte-os.

5º Passo Determine o comprimento adequado, puxe o pedaço mais longo para longe do pESCOço e corte o excesso.

Nota: Certifique-se de que a pele não será exposta à aba de segurança do tecido do ganho.

6º Passo Volte a juntar os dois lados e pressione com firmeza a aba de segurança do tecido do ganho branco no tecido do pESCOço para garantir uma segurança adequada.

Nota: Certifique-se de que o EZCare está apertado, mas não excessivamente esticado. Ajuste conforme necessário.

7º Passo Substitua o EZCare Softouch a cada 5 dias ou de acordo com o protocolo hospitalar, o que ocorrer primeiro.

Substitua imediatamente se a aba do ganho estiver visivelmente gasta ou suja.

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

Segundo a legislação em vigor, a venda deste dispositivo está sujeita a receita ou indicação médica.

Substitua imediatamente se a aba do ganho estiver visivelmente gasta ou suja. Abas desgastadas podem causar decanulação.

Verifique regularmente para evitar a desanexação.

Descontinue imediatamente a utilização em caso de irritação cutânea.

Utilize apenas num único paciente.

GEBRAUCHSHINWEIS

EZCare Softouch ist für die Fixierung von Trachealkanülen bei Patienten ausgelegt. Zur Verwendung bei pädiatrischen Patienten (Neugeborenen, Säuglingen und Kleinkindern) bestimmt.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Messen

Die richtige Größe durch Verwendung des Messstreifens von EZCare Softouch auswählen.

Die Startlinie an die Öse auf der linken Seite platzieren und den Streifen hinten um den Hals hin zur rechten Öse legen. Wenn auf Grundlage der Messung zwei Größen in Frage kommen, zunächst die größere wählen.

Einteilig (N9105-N9111)

Schritt 1 Mit der glatten, weißen Seite Richtung Hals die Lasche am äußerer Ende durch die Öse einer Halteplattenseite ziehen.

Schritt 2 Die Lasche dann über die Öse ziehen und den weißen Laschenstoff fest an den Stoff des Haltebandes andrücken, um eine korrekte Fixierung zu gewährleisten.

Schritt 3 Das EZCare-Halteband um den Hals legen und die Lasche am anderen Ende durch die Öse der anderen Halteplattenseite ziehen.

Schritt 4 Die Lasche dann über die Öse ziehen und den weißen Laschenstoff fest an den Stoff des Haltebandes andrücken, um eine korrekte Fixierung zu gewährleisten.

Hinweis: Einen straffen, aber nicht zu engen Sitz von EZCare sicherstellen. Nach Bedarf einstellen.

Schritt 5 EZCare Softouch gemäß Krankenhausprotokoll oder wenigstens alle 5 Tage erneuern.

Bei verschlissener oder sichtbar verschmutzter Lasche unverzüglich austauschen.

Zweiteilig (N925-N926)

Schritt 1 Die zwei Teile trennen.

Schritt 2 Mit der glatten, weißen Seite Richtung Hals die Laschen am Ende beider Bänder jeweils durch die Öse einer Halteplattenseite ziehen.

Schritt 3 Die Lasche dann über die Öse ziehen und den weißen Laschenstoff fest an den Stoff des Haltebandes andrücken, um eine korrekte Fixierung zu gewährleisten.

Schritt 4 Beide Seiten des EZCare-Haltebands um den Hals legen und zusammenführen.

Schritt 5 Die korrekte Länge bestimmen, die überschüssige Länge vom Nacken weg halten und abschneiden.

Hinweis: Sicherstellen, dass die Haut nicht mit dem Stoff der Sicherungslasche in Berührung kommt.

Schritt 6 Beide Seiten zusammenführen und den weißen Laschenstoff fest an den Stoff des Haltebandes andrücken, um eine korrekte Fixierung zu gewährleisten.

Hinweis: Einen straffen, aber nicht zu engen Sitz von EZCare sicherstellen. Nach Bedarf einstellen.

Schritt 7 EZCare Softouch gemäß Krankenhausprotokoll oder wenigstens alle 5 Tage erneuern.

Bei verschlissener oder sichtbar verschmutzter Lasche unverzüglich austauschen.

VORSICHTSMASSNAHMEN & WARNUNGEN

Nach Bundesgesetz darf dieses Gerät nur von einem Arzt oder auf Verordnung eines Arztes verkauft werden.

Bei verschlissener oder sichtbar verschmutzter Lasche unverzüglich austauschen. Eine verschlissene Lasche kann eine Dekanülierung verursachen.

Regelmäßig überprüfen, um unbeabsichtigtes Lösen zu vermeiden.

Bei Hautreizungen unverzüglich entfernen.

Nur für den Einmalgebrauch.

INDIKACE PRO POUŽITÍ

Držák EZCare Softouch je určen pro zajištění tracheostomické kanyly pacienta. Je určen pro použití u pediatrických pacientů (novorozenců, kojenců a dětí).

NÁVOD K POUŽITÍ

Měření

Vyberte správnou velikost pomocí dodaného měřicího proužku pásky EZCare Softouch.

Umístěte počáteční linii na levou stranu lemu a ovíjte ji krkem směrem k pravému lemu. Pokud měření vychází mezi velikostmi, vyzkoušejte nejdříve velikost větší.

Samostatný díl (N9105-N9111)

Krok 1 Poutko háčku zasuňte skrz lem na jedné straně desky tak, aby hladká, bílá strana směřovala ke krku.

Krok 2 Zatahničete poutko zpět přes lem a pevně přimáčkněte bílou tkaničku háčku ke tkaničce krčního pásku, aby bylo zajištěno rádné připevnění.

Krok 3 Ovíjte EZCare kolem krku a poutko háčku zasuňte skrz lem na druhou stranu desky.

Krok 4 Zatahničete poutko zpět přes lem a pevně přimáčkněte bílou tkaničku háčku ke tkaničce krčního pásku, aby bylo zajištěno rádné připevnění.

Poznámka: Ujistěte se, že je EZCare narovnaný, ale nikoliv příliš napnutý. Přizpůsobte podle potřeby.

Krok 5 EZCare Softouch vyměňujte každých 5 dní nebo podle běžného postupu nemocnice, podle toho, která z možností nastane dříve.

Ihned vyměňte, pokud je poutko háčku opotřebované nebo viditelně znečištěné.

2dílný (N925-N926)

Krok 1 Oddělte od sebe oba díly.

Krok 2 Poutka háčku zasuňte skrz lem na obou stranách desky tak, aby hladká, bílá strana směřovala ke krku.

Krok 3 Zatahničete poutko zpět přes lem a pevně přimáčkněte bílou tkaničku háčku ke tkaničce krčního pásku, aby bylo zajištěno rádné připevnění.

Krok 4 Ovíjte obě strany EZCare kolem krku a spojte je.

Krok 5 Určete správnou délku, delší díl vytáhněte směrem od krku a přebytek oddělte.

Poznámka: Zajistěte, aby kůže nebyla vystavena bezpečnostnímu poutku látkového háčku.

Krok 6 Obě strany znovu spojte a pevně přimáčkněte bílou tkaničku háčku ke tkaničce krčního pásku, aby byl zajištěno rádné připevnění.

Poznámka: Ujistěte se, že je EZCare narovnaný, ale nikoliv příliš napnutý. Přizpůsobte podle potřeby.

Krok 7 EZCare Softouch vyměňujte každých 5 dní nebo podle běžného postupu nemocnice, podle toho, která z možností nastane dříve.

Ihned vyměňte, pokud je poutko háčku opotřebované nebo viditelně znečištěné.

UPOZORNĚNÍ A VAROVÁNÍ

Podle federálního zákona USA smí být tento přístroj prodáván výlučně lékařem nebo na jeho pokyn.

Vyměňte okamžitě, pokud je připevnovací proužek opotřebovaný nebo viditelně špinavý. Opotřebovaný proužek může být příčinou dekanylace.

Pravidelně kontrolujte, aby se zabránilo uvolnění.

Pokud dojde k podráždění kůže, okamžitě je přestaňte používat.

Pouze pro jednoho pacienta.

ZASTOSOWANIE

Opaska EZCare Softouch służy do mocowania rurek tracheostomijnych. Produkt przeznaczony do użytku na oddziałach pediatrycznych (noworodki, niemowlęta i dzieci starsze).

ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

Pomiar

Wybierz odpowiedni rozmiar, korzystając z dostarczonej taśmy pomiarowej EZCare Softouch.

Rozpocznij pomiar od zaczepu po lewej stronie i owij i taśmą wokół szyi do zaczepu po prawej stronie. Jeżeli wartość pomiaru znajduje się między dwoma rozmiarami, należy spróbować użyć najpierw większego rozmiaru.

Opaska jednocienna (N9105-N9111)

Krok 1 Ustaw gładką białą powierzchnię tak, aby była skierowana w stronę szyi, i włóż końcówkę do zaczepu po jednej stronie płytki.

Krok 2 Przeciagnij końcówkę przez zaczep i mocno docisnij biały rzep na końcówce do opaski, aby zapewnić bezpieczne połączenie.

Krok 3 Ulóż opaskę EZCare na szyi i włóż końcówkę do zaczepu po drugiej stronie płytki.

Krok 4 Przeciagnij końcówkę przez zaczep i mocno docisnij biały rzep na końcówce do opaski, aby zapewnić bezpieczne połączenie.

Krok 5 Wymieniaj opaskę EZCare Softouch na nową co 5 dni lub częściej, zależnie od procedur szpitalnych.

Krok 6 Wymieniaj opaskę EZCare na szyi i połącz ze sobą.

Krok 7 Ustal prawidłową długość, odchyl dłuższy segment od szyi i odetnij zbędny odcinek.

Uwaga: Należy się upewnić, że rzep nie dotyka skóry.

Krok 8 Ponownie połącz obie części ze sobą i mocno docisnij biały rzep do opaski, aby zapewnić bezpieczne połączenie.

Krok 9 Ustal prawidłową długość, odchyl dłuższy odcinek od szyi i odetnij zbędny odcinek.

Krok 10 Wymieniaj opaskę EZCare Softouch na nową co 5 dni lub częściej, zależnie od procedur szpitalnych.

Krok 11 W przypadku uszkodzenia lub zanieczyszczenia rzepów należy natychmiast wymienić produkt na nowy. Zużycie rzepu może spowodować dekanylację.

Krok 12 Wymieniaj opaskę EZCare Softouch na nową co 5 dni lub częściej, zależnie od procedur szpitalnych.

Krok 13 W przypadku uszkodzenia lub zanieczyszczenia rzepów należy natychmiast wymienić produkt na nowy. Zużycie rzepu może spowodować dekanylację.

Krok 14 Należy regularnie sprawdzać, czy opaska jest prawidłowo zamocowana.

Krok 15 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry należy zrezygnować z używania produktu.

Krok 16 Produkt jest przeznaczony do użytku tylko dla pojedynczego pacjenta.